

### Algebra liniowa 1R, Lista 4

1. Uzasadnij równości:  $\det(M^{-1}NM) = \det(N)$ ,  $\operatorname{tr}(MN) = \operatorname{tr}(NM)$ ,  $\operatorname{tr}(M + N) = \operatorname{tr}(M) + \operatorname{tr}(N)$ ,  $\operatorname{tr}(M^{-1}NM) = \operatorname{tr}(N)$  ( $M, N, P$  są macierzami,  $t \in \mathbf{R}$ ).
  2. Dla jakich wartości parametru  $c$  macierz  $\begin{pmatrix} 2 & c \\ -c & 1 \end{pmatrix}$  ma (a) zero, (b) jedną, (c) dwie wartości własne.
  3. Znajdź wielomian charakterystyczny, wartości własne i wektory własne macierzy  
(a)  $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ , (b)  $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ , (c)  $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ , (d)  $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ , (e)  $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ , (f)  $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ .
  4. Policz  $M^{-1}$  dla następujących macierzy  $M$ :  $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ ,  $\begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ ,  $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 7 & 1 \end{pmatrix}$ ,  $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ ,  $\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$ .
- 

5. Rozwiąż podane równania macierzowe posługując się macierzami odwrotnymi:

$$(a) \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} M = \begin{pmatrix} 4 & -6 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad (b) \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} M \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

6. Sprawdź, że jedyną wartością własną macierzy  $\begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$  jest 5. To samo zrób dla macierzy  $\begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$ .  
Sprawdź, że jedna z tych macierzy diagonalizuje się, a druga nie.
  7. Przedstaw macierz  $M = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$  w postaci  $PDP^{-1}$ , gdzie  $D$  jest macierzą diagonalną. Zastosuj tę postać do obliczenia 6-tej potęgi macierzy  $M$ .
  8. Znajdź macierz przekształcenia liniowego, dla którego  $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$  jest wektorem własnym o wartości własnej  $-\frac{1}{2}$ , zaś  $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$  jest wektorem własnym o wartości własnej 1.
  9. Podaj przykład liniowego przekształcenia płaszczyzny, które zachowuje pole, zmienia orientację i ma wartość własną  $\pi$ .
  10. Które z poniższych przekształceń diagonalizują się? Dla tych które diagonalizują się, znajdź wartości własne oraz bazę wektorów własnych. (Wsk.: Rozwiązuj to zadanie geometrycznie, bez odwoływania się do macierzy)  
(a)  $R_\theta$ , (b)  $S_\ell$  ( $\ell$  – pewna prosta przechodząca przez  $O$ ), (c)  $J_r$ , (d)  $P_U$ .
  11. Napisz warunek na liczby  $a, b, c, d$  gwarantujący, że macierz  $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$  ma dwie różne wartości własne.
  12. Niech  $A = PMP^{-1}$ . Uzasadnij, że wielomiany charakterystyczne macierzy  $A$  oraz  $M$  są równe (wsk.: można to zrobić odwołując się do wzorów z ćwiczenia 1). Wywnioskuj, że jeśli macierz  $M$  ma dwie różne wartości własne  $\lambda, \mu$ , to  $\det(M) = \lambda\mu$ ,  $\operatorname{tr}(M) = \lambda + \mu$ . Czy założenie  $\lambda \neq \mu$  jest istotne?
  13. Załóżmy, że przekształcenie liniowe  $E$  spełnia warunek  $E \circ E = E$ . Jakie wartości własne może mieć to przekształcenie? Czy koniecznie musi być przekształceniem zerowym lub identycznościowym?
  14. Uzasadnij, że jeśli  $A = PDP^{-1}$  (gdzie  $D$  jest diagonalna), to kolumny  $P$  są wektorami własnymi  $A$ .
  15. Załóżmy, że wektory  $U, W \in \mathbf{R}^2$  są lnz, zaś macierz  $A$  spełnia warunki  $AU = 5U + 4W$ ,  $AW = 3U + 2W$ . Udowodnij, że istnieje odwracalna macierz  $P$ , taka że  $A = P \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} P^{-1}$ . Uogólnij.
- 
16. Załóżmy, że  $\det(F - x \cdot Id)$  ma podwójny pierwiastek  $\lambda$ , mimo że  $F$  nie jest jednokładnością. Udowodnij, że istnieją liniowo niezależne wektory  $U, W$ , takie że  $F(U) = \lambda U$ ,  $F(W) = U + \lambda W$ . Czy macierz  $F$  diagonalizuje się? Jeśli nie, to czy potrafisz wskazać dla niej jakiś substytut diagonalizacji? (Wsk. zad. 15)
  17. Udowodnij prawdziwość zdania  $(\forall A \in M_{2 \times 2}(\mathbf{R}))((\exists \lambda, \mu \in \mathbf{R})(\exists P \in M_{2 \times 2}(\mathbf{R}))(A = P \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \mu \end{pmatrix} P^{-1}) \iff ((\exists \lambda \in \mathbf{R})(A = \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}) \vee (\exists a, b \in \mathbf{R})(a \neq b \wedge \det(A - aI) = 0 \wedge \det(A - bI) = 0)))$ .
  18. Niech  $M = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ , zaś  $U$  niech będzie dowolnym wektorem. Zbadaj jak szybko rośnie długość wektora  $M^n U$  gdy  $n$  dąży do nieskończoności. (Uzasadnij, że istnieje stała  $C$  zależna (jak?) od wektora  $U$ , taka że granica  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\|M^n U\|}{C^n}$  jest liczbą dodatnią.)
  19. Przekształcenie liniowe  $F$  ma macierz  $\begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ . Wyznacz macierz opisującą działanie tego przekształcenia we współrzędnych związanych z bazą  $(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix})$ .
  20. Niech  $F$  będzie liniowym przekształceniem płaszczyzny, takim że  $\det F = 2$ . Udowodnij, że istnieje wektor  $U \in \mathbf{R}^2$ , taki że  $\|U\| = 1$ ,  $\|F^{20}(U)\| > 1000$ .